УДК 576.895.42

НОВЫЙ ВИД КЛЕЩА РОДА HAEMOGAMASUS (PARASITIFORMES, GAMASOIDEA)

А. С. Бондарчук

Читинский медицинский институт

Описана самка нового вида *Haemogamasus bujakovi* Bondartchuk sp. n. с азиатской лесной мыши из Тунгокоченского района Читинской области.

Самка. Длина тела 0.97—1.1, ширина — 0.48—0.51 мм. Дорсальный щит элипсоидной формы, не покрывает тела с боков и сзади; его длина 0.95—1.0, ширина 0.40—0.42 мм. Задний край щита закруглен. Весь щит густо покрыт щетинками, на его переднем конце F_1 длинные и слабо перистые. На стернальном щите три пары крупных собственно стернальных щетинок, из них первая пара — слабо перистая. На переднем крае стернального щита щетинок мало. Вблизи уровня St_1 одна-две щетинки. Более густо располагаются щетинки примерно от половины расстояния между St_1—St_2. Количество добавочных щетинок варьирует от 15 до 23 (рис. 6). Генито-вентральный щит с перетяжкой посередине, густо опушен лишь в задней расширенной части. На передней части имеются лишь собственно генитальные щетинки (рис. 1). Анальный щит с пятью добавочными щетинками, которые лишь немного короче аданальных. Постанальная щетинка длинная со следами перистости. Метаподальные щитки бобовидной формы. Перитремальные щитки от стигмы образуют выросты, которые срастаются с межкоксальными. Перитремальные щитки узкие, простираются до уровня заднего края первых кокс. Тритостернум с мелко рассеченными краями его основания и с длинными лациниями (рис. 5). Тектум высокий с широким основанием, его стороны и вершина глубоко рассечены. В свою очередь боковые ветви, особенно расположенные ближе к вершине, также двух- и трехраздельные (рис. 4). Максиллярные рожки крупные, треугольной формы. Вторая и третья гипостомальные пары и гнатосомальные щетинки слабо перистые. На внутренней стороне вертлуга педипальп имеется шиповидная со своеобразным опушением щетинка (рис. 2). Подвижный палец хелицер с изогнутой почти под прямым углом вершиной и двумя крупными зубцами на внутренней стороне. Неподвижный палец с крючковидно-загнутой вершиной, у основания которой имеется небольшой зубец, а несколько дальше еще два зубца. Вблизи первого зубца, отходящего от края изогнутой вершины, располагается прозрачный придаток, кинжаловидной формы. Клешня хелицер — крупная массивная (рис. 3). Лапка вторых ног, кроме обычных щетинок, имеет четыре утолщенных: одна менее утолщенная расположена у вершины лапки, вторая утолщенная — ближе к середине, а около нее расположена очень толстая с расщепленной вершиной. И еще одна утолщенная щетинка располагается ближе к основанию лапки. На колене, голени и бедре с внутренней стороны имеются несколько утолщенные у основания и с заостренными вершинами щетинки, из которых бедренная щетинка — перистая (рис. 7). Лапки четвертых ног с обычными длинными осязательными щетинками (рис. 8).

Описываемый вид наиболее близок к *Hg. hodosi* Gontcharova et Bujakova, 1961, но отличается несколько иным строением тектума, неподвижного пальца хелицер, большим количеством щетинок на стернальном щите и особенно наличием крупной двуразделенной щетинки на лапке вторых ног.

Материал. 3 самки с грызунов, отловленных в лиственично-березовых лесах в окрестностях пос. Усугли Тунгокоченского района Читинской области, из них две сняты с азиатской лесной мыши 14 сентября 1962 г. и 30 августа 1965 г., одна самка с сибирской красной полевки — 14 сентября 1962 г.

Голотип: самка с азиатской лесной мыши, 30 августа 1965 г. (Бондарчук), хранится в Зоологическом институте АН СССР, Ленинград. Паратипы хранятся в Читинском медицинском институте.



Рис. 1—8. *Haemogamasus bujakovi* Bondartchuk sp. n., самка.

1 — вентральная сторона; *2* — гнатосома; *3* — хелицера; *4* — тектум; *5* — тритостернум; *6* — стернальный щит.



Продолжение рисунка.

7 — II нога; *8* — лапка IV ноги.

Литература

Гончарова А. А., Буякова Т. Г. 1961. К изучению клещей семейства Haemogamasidae (Parasitiformes, Gamasoidea) в СССР. Зоолог. журн., 40 (2), М. : 276—280.

A NEW SPECIES OF MITES, HAEMOGAMASUS BUJAKOVI SP. N. (ACARINA, GAMASOIDEA)

A. S. Bondarchuk

SUMMARY

The female of the new species *Haemogamasus bujakovi* sp. n. is described from the Tungokochen region of the Chita district. Two females of the mite were taken from *Apodemus speciosus* and one from *Clethrionomys rutilus*.